

Tabelle 6: Soziodemographische und psychopathologische Variablen geteilt durch diagnostische Gruppe

	Kontrollen			FM ohne Sz.			FM mit Sz.			ANOVA	
	n	m	sd	n	m	sd	n	m	sd	F	p
Alter beim MRT (Jahre)	41	34,17	13,58	33	45,30	15,15	22	35,50	8,83	7,08	0,001
Dauer der Erkrankung (Jahre)							22	10,45	9,25	-	-
Alter bei Ersterkrankung (Jahre)							22	25,09	8,00	-	-
Körpergröße (cm)	36	172,81	7,64	32	171,78	9,53	16	176,44	8,48	1,62	0,20
Körpergewicht (kg)	36	67,63	9,72	32	72,75	11,29	16	79,00	14,46	5,79	0,004
PANSS positiv (Gesamtpunktzahl)	24	0,04	0,20	32	0,19	0,64	20	5,00	5,76	19,87	0,000
PANSS negativ (Gesamtpunktzahl)	24	0,00	0,00	32	0,28	0,96	20	7,20	7,33	25,43	0,000
Mini Mental Status Examination (MMSE-Punktzahl)	29	29,45	0,78	31	29,74	0,44	21	29,33	1,39	1,51	0,23
Premorbide Intelligenz (MWT B Punktzahl)	36	31,92	2,53	29	31,07	3,41	17	31,12	3,35	0,75	0,47
	# erster/#zweiter Begriff			# erster/#zweiter Begriff			# erster/#zweiter Begriff			ChiÄ	p
Geschlecht (# männlich/# weiblich)	22/21			16/18			16/6			3,90	0,14
Status der genetischen Belastung (# monoaffektiert/#multiaffektiert)	-			23/11			12/10			0,98	0,32
Schulbildung (#Hauptschule #höherer Abschluß)	6/30			7/25			3/19			0,66	0,72
Hand Präferenz (#rechts/# nicht rechts)	35/3			30/1			17/4			3,95	0,14

Legende: n=Sample Größe, m = mittlere Abweichung, sd = Standardabweichung;

Kontrollen = Kontrollpersonen von nicht affektierten Familien; FM ohne Sz. = Familienangehöriger ohne ICD10 F2 Diagnose; FM mit Sz. = Familienangehöriger mit Schizophrenie